



Startinformatie Hyrimoz®

Informatie voor patiënten
die Hyrimoz gebruiken

Inhoudsopgave

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HYRIMOZ 3

Wat is Hyrimoz?	4
Waarvoor wordt adalimumab gebruikt?	6
Wat is een biosimilar?	8
Bewaren van Hyrimoz	9
Wat moet u weten voordat u met Hyrimoz begint?	11
Vragenlijst voorafgaand aan de toediening van een biologisch geneesmiddel	13

PRIKINSTRUCTIE 15

SensoReady Pen	15
Voorgevulde spuit	19

HYRIMOZ OP REIS 23

PRIKDAGBOEK 26

BIJWERKINGEN 27

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 28

HANDIGE INFORMATIE 29

**Informatie
voor
patiënten
die Hyrimoz
gebruiken**

Informatie over het gebruik van Hyrimoz*

Uw arts heeft u een behandeling met Hyrimoz aanbevolen, een middel dat de werkzame stof adalimumab bevat. In deze gids vindt u informatie over de behandeling met adalimumab. Waarom dit geneesmiddel is aanbevolen en hoe u het toedient. Verder vindt u een aantal praktische tips en informatie over hoe Hyrimoz te bewaren en mee te nemen op reis.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over Hyrimoz of uw behandeling? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

*Deze brochure is opgesteld door Sandoz BV. Sandoz is de Nederlandse vertegenwoordiger voor het geneesmiddel Hyrimoz® (adalimumab). Deze brochure pretendeert geen volledigheid. Raadpleeg voor gebruik van dit geneesmiddel de volledige patiëntenbijsluiter, welke te vinden is in de verpakking met de Hyrimoz® voorgevulde injectiespuit of de SensoReady® auto-injector pen of op internet (<https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/>). Deze brochure is opgesteld in maart 2020.

Wat is Hyrimoz?


Hyrimoz bevat de werkzame stof adalimumab. Adalimumab is een biologisch geneesmiddel.

De meeste geneesmiddelen worden gemaakt door chemische ingrediënten te combineren. Biologische geneesmiddelen zijn anders omdat ze eiwitten bevatten die door levende cellen zijn gemaakt. Ze zijn ontwikkeld om in te werken op een bepaald molecuul, een bepaalde cel of een andere structuur in het lichaam.


Biologische geneesmiddelen worden vaak toegediend via een injectie onder de huid of intraveneus via een infuus.

Hyrimoz wordt toegediend via een automatische injectiepen of voorgevulde spuit.

De SensoReady pen




De voorgevulde spuit



Waarvoor wordt adalimumab gebruikt?

Adalimumab wordt voorgeschreven bij verschillende ontstekingsziekten. Vaak zijn het ontstekingen van de gewrichten, ogen, darmen of de huid.



Normaal ontstaat een ontsteking als het lichaam vecht tegen bacteriën en virussen. Bij mensen met een auto-immuunziekte is dit proces niet onder controle en valt het eigen lichaam het eigen weefsel aan.

In dit geval wordt er te veel van de stof tumor necrose factor (TNF) geproduceerd, wat kan leiden tot ontstekingen en aantasting van gewrichten of andere organen. Door het gebruik van adalimumab kunnen ontstekingen onder controle worden gehouden en de klachten die ze veroorzaken afnemen, waardoor u zich weer beter gaat voelen.

Overzicht van de ontstekings- ziekten die met Hyrimoz behandeld kunnen worden:

- Reumatoïde artritis
- Polyarticulaire juveniele idiopathische artritis
- Enthesitis gerelateerde artritis
- Spondylitis ankylopoetica
- Axiale spondylartritis zonder röntgenologisch bewijs van spondylitis ankylopoetica
- Artritis psoriatica
- Psoriasis
- Hidradenitis suppurativa
- Ziekte van Crohn
- Colitis ulcerosa
- Niet infectieuze uveïtis

Wat is een biosimilar?

Adalimumab is al meer dan 10 jaar beschikbaar. Het patent op dit geneesmiddel is inmiddels verlopen.

Nadat een patent is verlopen kunnen andere farmaceutische bedrijven het geneesmiddel ook maken. Fabrikanten die het geneesmiddel maken moeten altijd aantonen dat hun geneesmiddel net zo werkt als, en vergelijkbaar ('biosimilar') is met het originele biologische geneesmiddel.

Het toetsen gebeurt door de EMA (European Medicines Agency) en het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Zij bepalen of het middel gelijkwaardig is aan het originele geneesmiddel en of het op de markt wordt toegelaten. Hyrimoz is een biosimilar en is sinds oktober 2018 tot de markt toegelaten.

Wat u moet weten indien u adalimumab eerder in een andere vorm heeft gebruikt

Hyrimoz is zo ontwikkeld dat het een **bewezen vergelijkbare structuur** en vergelijkbare kenmerken heeft als het originele geneesmiddel. Het werkt op dezelfde manier tegen uw ziekte.

Bewaren van Hyrimoz



Bewaar Hyrimoz altijd in de **originele verpakking.**



Leg Hyrimoz **in de koelkast** tussen 2 en 8 graden Celcius.



- **Niet** in de vriezer.
- **Niet** tegen de **achterwand van de koelkast** aanleggen om bevriezing te voorkomen.



Niet schudden.



Laat dit geneesmiddel **niet in de zon** liggen.



Gebruik een **koeltas** met koelelementen voor het vervoer van dit geneesmiddel.*



Lees altijd de bijsluiter van Hyrimoz voordat u met dit geneesmiddel begint.



Gebruik Hyrimoz niet wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken.



Eén enkele pen of spuit kunt u **maximaal 14 dagen bij kamertemperatuur bewaren (max. 25 °C).**

Enmaal uit de koelkast gehaald voor bewaring bij kamertemperatuur, moet de pen of spuit binnen 14 dagen gebruikt worden of worden afgevoerd, ook als deze later in de koelkast wordt teruggelegd.

* Het is niet voor alle koeltassen bewezen dat de inhoud tussen de 2 en 8 graden Celsius blijft en ze dus geschikt zijn om uw geneesmiddel koel te bewaren. Gebruik alleen een koeltas waarvoor dat is aangetoond.

Wat moet u weten voordat u met Hyrimoz begint?

Voorafgaand aan de behandeling met adalimumab zal uw arts of de verpleegkundige uw medische voorgeschiedenis doornemen, evenals allergieën of andere aandoeningen die u heeft en de medicatie die u nu gebruikt.

Ook kunnen er een aantal **screeningstests** worden gedaan om te bepalen of u **geen tuberculose** heeft en zal er **bloedonderzoek** worden gedaan om te bekijken of u geen infectie heeft.


Het is belangrijk uit te sluiten dat u inactieve tuberculose heeft, want behandeling met een biologisch geneesmiddel kan deze weer activeren.

Zodra u instructie gekregen heeft van uw behandelend arts of verpleegkundige, kunt u **zelf de injecties toedienen**.



De injecties worden subcutaan oftewel onder de huid ingespoten met behulp van een automatische injectiepen (Sensoready) of voorgevulde spuit.

**Meestal 1x
per 2 weken.**



De dosis die u moet toedienen zal uw arts met u bespreken en hangt af van de aandoening waarvoor u wordt behandeld.

Vragenlijst voorafgaand aan de toediening van een biologisch geneesmiddel

In een aantal gevallen wordt u afgeraden de volgende injectie met een biologisch geneesmiddel toe te dienen.*

Het is goed de vragenlijst op de volgende pagina voor de start van de behandeling met Hyrimoz met uw arts of verpleegkundige te bespreken.

Overleg bij beantwoording van een van de vragen met 'ja', of bij twijfel, eerst met uw behandelaar of u de Hyrimoz injectie kunt toedienen.

*Herziene richtlijn voor reumaverpleegkundigen:
Begeleiding, voorlichting en toediening van biologicals voor reumapatiënten.
V&VN Reumatologie. Bijlage Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie 2010:4.

Gebruik de vragenlijst iedere keer voordat u zichzelf Hyrimoz toedient:

1. Zijn er eventuele geplande operaties of tandheelkundige ingrepen?
2. Hebt u wondjes, uitslag of gebitsproblemen?
3. Hebt u koorts, keelpijn of bent u verkouden?
4. Hebt u diarree?
5. Hebt u pijn bij plassen?
6. Bent u kortademig of hebt u gezwollen enkels?
7. Gebruikt u antibiotica?
8. Hebt u benauwdheidsklachten of moet u hoesten?
9. Hebt u bijwerkingen gehad na de voorgaande injectie?
10. Hebt u een zwangerschapswens of bent u zwanger?

Prikinstructie SensoReady PEN



Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking voordat u met Hyrimoz begint. Op **www.hyrimoz.nl** vindt u een instructievideo die u vertelt hoe Hyrimoz toe te dienen. U kunt inloggen met de EU code die op de verpakking staat.


1. Voorbereiding




- Haal de Hyrimoz pen ongeveer **15 tot 30 minuten van te voren** uit de koelkast.
- Was uw handen met water en zeep.
- Haal de pen uit de verpakking en controleer of de vloeistof helder en kleurloos tot licht opaalachtig is.
- Gebruik de pen **niet** als u ziet dat de oplossing deeltjes bevat en/of verkleurd is.
- Gebruik de pen **niet** als u ziet dat de verzegeling op de buitenverpakking of de veiligheidsverzegeling op de pen is verbroken.
- Schud de pen **niet**.
- Indien de pen is gevallen mag u deze **niet** gebruiken als deze beschadigd lijkt. Ook niet als u de pen laat vallen wanneer de dop verwijderd is.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum (EXP) op uw pen. Gebruik de pen **niet** als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

2. Het kiezen van de injectieplaats

- Kies een geschikte injectieplaats op de voorkant van de dijen (bovenbenen) of de onderbuik (figuur 1).
- Zorg ervoor dat u niet prikt in het gebied **rondom 5 cm** van de navel.
- Bespreek met uw behandelaar of deze adviseert dat u het gebied waar u gaat prikken met een alcoholdoekje schoon maakt.
- Maak het gebied waar u gaat prikken schoon met een alcoholdoekje (**niet meegeleverd**).
- Laat de huid goed drogen voordat u gaat prikken.
- Raak de injectieplaats hierna niet meer aan.
- Draai de dop open in de richting van de pijlen (figuur 2).
- Gebruik de pen **binnen 5 minuten** nadat u de dop heeft verwijderd.
- U kunt een paar druppels vloeistof uit de naald zien komen. Dit is normaal.




Figuur 1
Injectieplaatsen.



Figuur 2
Draairichting dop.


3. Het toedienen van de injectie

- Houd de pen in een hoek van 90 graden ten opzichte van de injectieplaats (figuur 3).
- Druk de pen stevig op de huid om de injectie te starten (figuur 4).
- Houd de pen stevig tegen uw huid gedrukt.
- Tijdens het injecteren hoort u een klik. Dit betekent dat de injectie gestart is.
- Zodra de injectie bijna voltooid is hoort u weer een klik.
- Blijf de pen stevig tegen uw huid drukken totdat u ziet dat de groene indicator het venster helemaal vult en niet meer beweegt (figuur 5).
- Druk nadat u de pen heeft verwijderd een watje of gaasje kortdurend op de huid.




Figuur 3

Houd de pen in een hoek van 90°.



Figuur 4

Druk de pen stevig op de huid.



Figuur 5

Blijf de pen stevig tegen uw huid drukken totdat de groene indicator het venster helemaal vult en niet meer beweegt.

4. Het weggooien van het materiaal

- Gooi de pen weg in een afvalbakje voor scherpe voorwerpen en gebruik deze niet opnieuw (figuur 6).
- Een naaldencontainer wordt **niet meegeleverd**. Vraag uw apotheker om meer informatie.
- Houd de naaldencontainer altijd buiten bereik van kinderen!
- Noteer de datum en de plaats waar u geprikt heeft in het dagboekje en wissel deze een volgende keer af met een andere plaats.



Figuur 6

Gooi de pen weg in een naaldencontainer en gebruik deze niet opnieuw.

Belangrijk!


Wanneer de vloeistof niet voldoende op kamertemperatuur is gekomen kan het injecteren gevoelig zijn.

- Haal de pen daarom op tijd uit de koelkast (**ongeveer 15 tot 30 minuten**)!
- Zorg ervoor dat de alcohol **goed droog** is nadat u de huid heeft schoongemaakt om te voorkomen dat het prikken gevoelig is.

Prikinstructie voorgevulde SPUIT



Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking voordat u met Hyrimoz begint. Op www.hyrimoz.nl vindt u een instructievideo die u vertelt hoe Hyrimoz toe te dienen. U kunt inloggen met de EU code die op de verpakking staat.




1. Voorbereiding


- Haal de Hyrimoz spuit **ongeveer 15 tot 30 minuten van te voren** uit de koelkast.
- Was uw handen met water en zeep.
- Haal de spuit uit de verpakking en controleer of de vloeistof helder en kleurloos tot licht opaalachtig is.
- Gebruik de spuit **niet** als u ziet dat de oplossing deeltjes bevat en/of verkleurd is.
- Gebruik de spuit **niet** als u ziet dat de verzegeling op de buitenverpakking of de veiligheidsverzegeling op de spuit is verbroken.
- Schud de spuit **niet**.
- Indien de spuit is gevallen mag u deze **niet** gebruiken als deze beschadigd lijkt. Ook niet als u de spuit laat vallen wanneer de dop verwijderd is.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum (EXP) op uw spuit. Gebruik de spuit **niet** als de uiterste gebruiksdatum is verstreken.

2. Het kiezen van de injectieplaats

- Kies een geschikte injectieplaats op de voorkant van de dijen (bovenbenen) of de onderbuik (figuur 8).
- Zorg ervoor dat u niet prikt in het gebied **rondom 5 cm** van de navel.
- Bespreek met uw behandelaar of deze adviseert dat u het gebied waar u gaat prikken met een alcoholdoekje schoon maakt.
- Maak het gebied waar u gaat prikken schoon met een alcoholdoekje (**niet meegeleverd**).
- Laat de huid goed drogen voordat u gaat prikken.
- Raak de injectieplaats hierna niet meer aan.
- Verwijder de naalddop (figuur 9).
- Gebruik de spuit **binnen 5 minuten** nadat u de naalddop heeft verwijderd.
- U kunt een paar druppels vloeistof uit de naald zien komen. Dit is normaal.




Figuur 8
Injectieplaatsen.



Figuur 9
Verwijder de naalddop.

3. Het toedienen van de injectie

- Pak de huid op de injectieplaats tussen duim en wijsvinger voorzichtig vast (figuur 10).
- Injecteer niet op plaatsen waar de huid pijnlijk, gekneusd, rood, schilferig of hard is.
- Breng de naald in op de injectieplaats.
- Druk de zuiger langzaam zover mogelijk omlaag (figuur 11).
- Houd de injectiespuit gedurende 5 seconden zo vast met de zuiger ingedrukt.
- Trek de naald in een rechte lijn uit de injectieplaats (figuur 12).
- Laat de zuiger los zodat de naaldbescherming de naald afdekt (figuur 13).
- Druk nadat u de naald heeft verwijderd een watje of gaasje kortdurend op de huid.





Figuur 10

Pak de huid tussen duim en wijsvinger vast.

Figuur 11

Druk de zuiger langzaam zover mogelijk omlaag.



Figuur 12

Trek de naald in een rechte lijn uit de injectieplaats.

4. Het weggooien van het materiaal

- Gooi de injectiespuit weg in een afvalbakje voor scherpe voorwerpen en gebruik hem niet opnieuw (figuur 13).
- Een naaldencontainer wordt **niet meegeleverd**. Vraag uw apotheker om meer informatie.
- Houd de naaldencontainer altijd buiten bereik van kinderen!
- Noteer de datum en de plaats waar u geprikt heeft in het dagboekje en wissel deze een volgende keer af met een andere plaats.



Figuur 13

Laat de zuiger los zodat de naaldbescherming de naald afdekt & gooi de spuit weg in een naaldencontainer.

Belangrijk!

De voorgevulde injectiespuit heeft een naaldbescherming die na afloop van de injectie automatisch de naald afdekt.

Als u de zuiger zover mogelijk omlaag drukt om de injectie toe te dienen wordt de naaldbescherming na de injectie geactiveerd als u de zuiger loslaat. Wanneer de vloeistof niet voldoende op kamertemperatuur is gekomen kan het injecteren gevoelig zijn.

- Haal de spuit daarom op tijd uit de koelkast (**ongeveer 15 tot 30 minuten**)!
- Zorg ervoor dat de alcohol **goed droog** is nadat u de huid heeft schoongemaakt om te voorkomen dat het prikken gevoelig is.

Hoe neem ik Hyrimoz mee op reis?



Hyrimoz moet altijd koel bewaard worden tussen 2 en 8 graden Celcius

- Bewaar Hyrimoz ook op vakantie in de koelkast.
- Gebruik een koeltas met koelelementen om Hyrimoz in te vervoeren tijdens de reis. Zorg dat deze koeltas geschikt is om medicijnen in te koelen.*

Vaccinaties voor op reis

- Als u Hyrimoz gebruikt mag u geen vaccinaties krijgen met levende vaccins.
- Hieronder vallen onder meer tyfus oraal (door de mond) en gele koorts.
- Als u in het verleden niet tegen gele koorts bent ingeënt dan kan reizen naar landen waar gele koorts voorkomt worden **afgeraden**.

Auto

- Neem uw medicatie mee in de geschikte koeltas* met koelelementen en plaats de koeltas op een plek uit de zon.
- Laat Hyrimoz nooit in de zon liggen, zeker niet achter een autoruit.

* Het is niet voor alle koeltassen bewezen dat de inhoud tussen de 2 en 8 graden Celsius blijft en ze dus geschikt zijn om uw geneesmiddel koel te bewaren. Gebruik alleen een koeltas waarvoor dat is aangetoond.

Vliegen

Neem dit geneesmiddel altijd mee in de handbagage om mogelijke bevriezing in het bagageruim van het vliegtuig te voorkomen.

Neem uw medicijnen altijd mee in de originele verpakking

Laat de sticker van de apotheek met daarop uw naam en de naam van de apotheek altijd op de verpakking zitten. Zo is duidelijk dat de medicatie voor uw eigen gebruik is.

Artsenverklaring

- U kunt een artsverklaring nodig hebben om Hyrimoz over de grens mee te mogen nemen.
- Per land gelden andere regels voor het meenemen van voorgevulde pennen of spuiten met een naald.
- Neem contact op met uw arts of verpleegkundige om te horen of een artsverklaring op uw reis noodzakelijk is. Zij kunnen zo'n verklaring voor u opstellen.
- Voor meer informatie over een artsverklaring zie website van het CAK.

Zie: <https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis/advies-verklaringen>

Medicijnpaspoort

- In het medicijnpaspoort staan alle medicijnen die u gebruikt of waar u overgevoelig voor bent. Dit is handig wanneer u in het buitenland een apotheek of arts bezoekt.
- U kunt een medicijnpaspoort in zowel het Nederlands als het Engels opvragen bij uw apotheek of (huis) arts.

Een enkele pen of spuit ongekoeld mee

















- Gaat u op reis dan mag u een enkele pen of spuit gedurende 14 dagen bewaren bij kamertemperatuur (tot maximaal 25 graden).
- Noteer de datum waarop de pen of spuit uit de koelkast wordt gehaald en de datum tot wanneer deze gebruikt mag worden.
- Neemt u meer dan 1 pen of spuit mee op reis? Bewaar deze dan gekoeld tijdens de reis en op vakantie.

Tip!

Als u kort na een injectie op vakantie gaat, heeft u tijdens een vakantie van 3 weken maar één pen of spuit nodig. Als u die gedurende 14 dagen lang bij kamertemperatuur kunt bewaren, hoeft u geen koeltas mee te nemen op vakantie.

Prikdagboek


Hieronder kunt u per keer aangeven waar u geprikt heeft.

Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 
Datum: 	Datum: 	Datum: 	Datum: 

Bijwerkingen

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen hebben en in de loop van uw behandeling kunt u één of meer van deze bijwerkingen krijgen, hoewel niet iedereen ze krijgt. Het is helaas niet mogelijk om te voorspellen welke bijwerkingen u krijgt en ze kunnen variëren in ernst en duur. Lees altijd de bijsluiter die in de verpakking van Hyrimoz zit voor de laatste informatie over dit onderwerp.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van het geneesmiddel (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)



Reacties op de injectieplaats
(waaronder pijn, zwelling,
roodheid of jeuk).



Infecties van de ademhalingswegen
(waaronder verkoudheid, loopneus,
ontsteking van de neusbijholten,
longontsteking).



Hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid
en braken, huiduitslag en spierpijn.

Lees de bijsluiter voor informatie over de minder dan zeer vaak voorkomende bijwerkingen van het geneesmiddel. In de bijsluiter wordt ook aangegeven bij welke tekenen of symptomen u meteen medische hulp moet inschakelen of uw arts zo snel mogelijk dient te informeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn, neem dan contact op met uw arts voordat u Hyrimoz gebruikt.

U dient het gebruik van een goed voorbehoedsmiddel te overwegen om zwangerschap te voorkomen en het gebruik ervan voort te zetten tot minimaal 5 maanden na de laatste behandeling.

Hyrimoz mag alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dat noodzakelijk is. Neem eerst contact op met uw arts als u dit geneesmiddel gebruikt en zwanger wilt worden.

Hyrimoz kan tijdens borstvoeding worden gebruikt.

- ▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door elke bijwerking die u ondervindt te melden. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden www.lareb.nl. Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij Sandoz B.V.

Handige informatie

Uw arts of verpleegkundige kan u het volgende geven:

- de patiëntenwaarschuwingskaart van Hyrimoz.
- deze kaart moet u altijd bij zich dragen tijdens uw behandeling met Hyrimoz en tot 4 maanden nadat u de laatste injectie heeft gehad.
- de kaart: Hoe neem ik Hyrimoz® (adalimumab) mee op reis?
- medicijnpaspoort/artsenverklaring.



Handige links naar verdere informatie

www.reumanederland.nl

www.reumazorgnederland.nl

www.crohn-colitis.nl

www.psoriasisvereniging.nl

www.cbg-meb.nl

Naam _____

Ziekenhuis _____

Behandelend arts _____

Telefoonnummer _____

Verpleegkundige _____

Datum eerste injectie _____

Dosis _____

Notities
